

GENGIGEL® PROF „Syringes”

0,8% hialuronsavat tartalmazó (hialuronan) periodontális gél (fogínygél)

A hialuronsav fiziológiailag az egyik legfontosabb proteoglikán, amely természetes módon megtalálható a nyálkahártya extracelluláris mátrixában, ahol kapcsolatba lép a kötőszövet más komponenseivel, hogy biztosítsa a jó szájhigiéniahoz alapvetően fontos szilárdságot és rugalmasságot.

A hialuronsavnak számos előnyös tulajdonsága van, amely hozzájárul a sikeres fogászati kezelési programhoz és a szájhigiéniahoz. Különösen fontos, hogy a hialuronsav száraz súlya 50-szeresének megfelelő mennyiségű vizet tud felszívni.

Ez a tulajdonsága lehetővé teszi, hogy meggátolja a mikroorganizmusok és egyéb mérgező anyagok behatolását, amelyek valószínűleg hozzájárulnak a periodontális betegség kialakulásához.

Gengigel® prof Syringes (professzionális injekciós fecskendők)

- Nem állati eredetű, biotechnológiailag előállított, kiváló minőségű, nagy tisztaságú hialuronsavat tartalmaz nagy molekulásúlyú nátriumsó formájában
- Hosszantartó helyi hatása van
- A speciális jellegű termékreceptúrának köszönhetően hozzátapad a nyálkahártyához
- Korlátozás nélkül használható az összes betegnél, beleértve a gyermekeket, terhes nőket, időseket és cukorbetegeket is

Javallatok

- Támogatja és felgyorsítja a szövet helyreállítását bármilyen sérüléses állapot után (sebészeti beavatkozás, implantátumok, foghúzás, fogkö eltávolítás, stb.)
- Alapos, nem műtéti sebtisztítás után csökkenti az üreg mélységét
- Támogatja és felgyorsítja az ödéma- és gyulladás gátló folyamatokat
- Csökkenti a vérzést

A Gengigel® prof Syringes különösen javallott a periodontitis (foggyökérhártya-gyulladás) összes formájában, beleértve a súlyos formákat is, a műtét előtti fázisokban, és bármilyen olyan szituációban, amikor a sérülés áthatol a bőrön.

Használati utasítás

Az 1 ml-es előtöltött fecskendőt a speciális kialakítású, hosszú és rugalmas műanyag tűvel ellátott, eldobható csúccsal együtt kell használni, ami garantálja, hogy a Gengigel® prof Syringes mélyen a fog körüli üregekbe jusson. Miután a csavaros kupakot leveszi a fecskendőről, helyezze fel az eldobható csúcscot, és alkalmazza a betegnél.

Figyelmeztetések

Eldobható termék; nyílt műtéti sérüléseknél nem használható.

A termékkel szembeni ismert egyéni érzékenység esetén nem használható.

Tárolás: 5°C és 40°C között.